

Vladimír Šumera

Samovyšetřování včelstev.

Samovyšetřování včelstev.

- **Rozhodující pro zdravotní stav včelstva v létě a v podletí je počet VD, kteří přežili zimu i léčení**
- **Ve včelstvu je 50x až 60x více živých roztočů, než kolik je přirozený spad za jeden zimní měsíc.**
- **Každé 3 týdny se jejich počet zvýší 3x**
- **Za 3 měsíce od dubna do konce června tak může stoupnout množství roztočů až 80x proti počtu v předjaří.**
- **2500 VD = ohrožení včelstva**
- **Vyšetření zimní měli – je jen orientační.**
- **Samovyšetření – ve kterých úlech roztoči jsou a kolik.**

Pracovní postup

- Očištěné podložky zpět do úlů.
- Přibližně po měsíci odběr z každého úlu zvlášť.
Označit číslem.

Potřebné pomůcky:

- Líh
- kelímek
od
jogurtu
- papír



Vyšetření:

- Měl z jednotlivých úlů na kus papíru(novin), označit číslem úlu a zamotat tak, jak je vidět na obrázku.
- Několik dní nechat vyschnout.

Vyšetření:

- Do kelímku od jogurtu běžný syntetický líh a vzorky měli do něj postupně sypat.
- Měl klesne ke dnu a na hladině zůstanou roztoči

